

PROSPECTO

MEDEBIOTIN FUERTE COMPRIMIDOS (BIOTINA)



Composición:

Por comprimido:

Biotina (DCI) 5 mg.

Excipientes:

Sílice coloidal, talco, almidón de maíz, polivinilpirrolidona, PEG 6000+4000, estearato de Mg, bicarbonato sódico, celulosa microcristalina y metilparabén.

Forma farmacéutica y contenido del envase:

Envase con 40 comprimidos.

Actividad:

La Biotina es necesaria para el funcionamiento adecuado de los enzimas que transportan las unidades carboxilo y fijan el Dióxido de Carbono. Es imprescindible para varias funciones metabólicas, incluyendo la gluconeogénesis, lipogénesis, biosíntesis de ácidos grasos, metabolismo del propionato y catabolismo de aminoácidos de cadena ramificada.

Titular y fabricante:

Titular:

Laboratorios Medea, S.A.
Gran Capitán 10
08970 Sant Joan Despí Barcelona

Fabricante:

Laboratorio Reig Jofre, S.A.
Gran Capitán 10
08970 Sant Joan Despí Barcelona

Indicaciones:

Tratamiento de los estados carenciales de Biotina o cuando existe un aumento de las necesidades de dicha vitamina.

La deficiencia de Biotina puede dar lugar a dermatitis y alopecia, entre otros trastornos.

Las necesidades de Biotina pueden estar incrementadas en afecciones como la dermatitis seborreica de la infancia.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la especialidad.

Precauciones:

No se han descrito.

Importante para la mujer:

El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico. Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Interacciones e incompatibilidades:

Existen indicios de que los fármacos anticonvulsivantes, tras largo tiempo de tratamiento, pueden reducir el nivel plasmático de la Biotina.

Advertencias:

- Embarazo y lactancia: No se han descrito problemas en humanos con la ingesta de las dosis recomendadas.
- Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria: no se han descrito.

Posología:

Uno o dos comprimidos al día por vía oral.

Instrucciones para la correcta administración del preparado:

Los comprimidos se ingerirán con un poco de líquido.

Sobredosis:

En el hombre no se han observado reacciones tóxicas a la Biotina, incluso a dosis muy elevadas.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

Reacciones adversas:

No se han descrito. Pero si se produce cualquier reacción adversa atribuible a la toma del medicamento consulte a su médico o farmacéutico.

Conservación:

Almacenar a temperatura ambiente.

Caducidad:

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.



Otras Presentaciones:

Medebiotin inyectables. 1 mg. Biotina/inj. Caja con 10 inyectables.

Medebiotin Fuerte inyectables. 5 mg. Biotina/inj. Caja con 10 inyectables.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS**

TEXTO REVISADO: DICIEMBRE 1996.