

## **Prospecto: información para el usuario**

### **Imonogas 240 mg cápsulas blandas**

Simeticona

**Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 10 días de tratamiento.

### **Contenido del prospecto:**

1. Qué es Imonogas y para qué se utiliza
2. Antes de tomar Imonogas
3. Cómo tomar Imonogas
4. Posibles efectos adversos
5. Cómo conservar Imonogas
6. Información adicional

### **1. Qué es imonogas y para qué se utiliza**

Imonogas actúa rompiendo los gases atrapados que causan hinchazón.

Se utiliza para el tratamiento sintomático de los gases (flatulencia) que hacen sentir su estómago hinchado.

### **2. Antes de tomar imonogas**

#### **No tome Imonogas:**

- Si es alérgico a la simeticona o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico si:

- no mejora después de 10 días de tratamiento
- tiene estreñimiento continuado.

### **Embarazo y lactancia**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar este medicamento.

Imonogas puede tomarse durante el embarazo y el periodo de lactancia ya que el paso de simeticona a sangre es insignificante.

### **Conducción y uso de máquinas:**

La toma de Imonogas no afecta a la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

### **3. Cómo tomar imonogas**

Siga estas instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

En caso de duda consulte con su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es:

**Mayores de 15 años:** Tome 1 cápsula después de cada comida principal (comida y cena). Este medicamento se toma por vía oral.

Trague la cápsula con un vaso grande de agua.

No tomar más de 3 cápsulas al día.

Si los síntomas no mejoran en 10 días debe suspender el tratamiento y acudir al médico.

### **Si toma más Imonogas del que debe**

Consulte a su médico o farmacéutico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico, farmacéutico o llame el Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20 (Indicando el medicamento y la cantidad ingerida).

### **Si olvida tomar Imonogas**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

En caso necesario tome 1 cápsula después de la siguiente comida principal.

## **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos Imonogas puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Deje de tomar Imonogas y acuda al médico inmediatamente si presenta síntomas de angioedema tales como hinchazón de cara, lengua o garganta, dificultad para tragar, urticaria y dificultad para respirar.

Se han producido los siguientes efectos adversos con frecuencia no conocida (no se puede estimar la frecuencia a partir de los datos disponibles):

- Dolor abdominal, náuseas, vómitos y estreñimiento
- Reacciones alérgicas, tales como erupción en la piel, picor, hinchazón de cara, labios, garganta y lengua o dificultad para respirar.

### **Comunicación de efectos adversos:**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:


<https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## **5. Conservación de imonogas**

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice Imonogas después de la fecha de caducidad que aparece en el blister o el estuche después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto Sigre  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su

farmacéutico como deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudara a proteger el medio ambiente.

## 6. Información adicional

### Composición de Imonogas:

El principio activo es Simeticona. Cada cápsula contiene 240 mg de simeticona.  
Los demás componentes son gelatina y glicerol (E 422).

### Aspecto del producto, y contenido del envase:

Imonogas son cápsulas blandas de gelatina transparente. Cada envase contiene 10, 20 ó 30 cápsulas.  
Puede que solo estén comercializados algunos tamaños de envases.

### Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación:

#### Titular de la autorización:

Johnson & Johnson S.A.  
Paseo de las Doce Estrellas, 5-7. 28042-Madrid. España

#### Responsable de la fabricación:

Catalent France Beinheim S.A.  
74 rue Principale  
67930 Beinheim, Francia

O

Johnson & Johnson Consumer NV/SA  
Antwerpseweg 15-17  
2340 Beerse, Belgica

### Este medicamento está autorizado en otros países bajo las siguientes denominaciones:

**Dinamarca:** IMOGAS

**Suecia:** IMOGAS 240 mg mjuk kapsel,

**Islandia:** IMOGAZE 240 mg, mjúk hylki

**España:** IMONOGAS 240 mg cápsulas blandas

**Portugal:** IMOGAS 240 mg, capsulas moles

**Bélgica:** IMONOGAS 240 mg zachte capsules

**Luxemburgo:** IMONOGAS

**Noruega:** IMOGAS kapsel, 240 mg

**Irlanda:** IMOGAS 240 mg Soft Capsules

**Este prospecto ha sido aprobado en Junio 2014**

### Consejos de Educación Sanitaria

Problemas digestivos:

**Indigestión:**

Se puede producir si usted:

Come demasiado

Come comidas ricas en grasas

Come demasiado rápido, sin masticar

Bebe demasiado alcohol con las comidas

Trate de evitar estos desencadenantes

**Gases (flatulencia):**

Con algunas comidas es más probable la aparición de gases porque:

Contienen aire por sí mismas (por ejemplo bebidas gaseosas, pan fresco)

Contienen altos niveles de carbohidratos los cuales no se absorben (por ejemplo, verduras secas, repollo, verduras crudas, cebollas)

Trate de evitar estas comidas

Consulte a su médico o farmacéutico si necesita más información.

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>