

## PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

### Thrombescina comprimidos de liberación prolongada®

Extracto de *Aesculus hippocastanum*

#### **Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.**

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran, o si persisten después de **4 semanas** de tratamiento, debe consultar al médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

#### **En este prospecto se explica:**

1. Qué es THROMBESCINA y para qué se utiliza
2. Antes de tomar THROMBESCINA
3. Cómo tomar THROMBESCINA
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de THROMBESCINA
6. Información adicional

### **1. Qué es THROMBESCINA y para qué se utiliza**

Thrombescina aumenta la resistencia capilar, mejora el tono venoso y la velocidad del flujo sanguíneo. Thrombescina está indicado para el alivio temporal de los síntomas en piernas con varices tales como dolores, sensación de pesadez, hormigueo, calambres nocturnos y prurito.

### **2. Antes de tomar THROMBESCINA**

#### **No tome Thrombescina:**

- Si es usted alérgico a las semillas de *Aesculus hippocastanum* (Castaño de Indias) o a cualquier otro de los componentes del medicamento.
- Si tiene menos de 12 años.

#### **Tenga especial cuidado con Thrombescina:**

- Si usted está utilizando vendas elásticas o medias de compresión, no las deje de usar sin consultar a su médico.
- Se recomienda la consulta inmediata al médico, cuando, al administrar Thrombescina, en los casos de problemas causados por varices y en una sola pierna, se manifestara una reacción súbita que se caracteriza por aparición de edema, coloración de la piel o sensaciones de tensión, calor o dolor, ya que pueden ser síntomas de una enfermedad grave. Si los síntomas persisten o empeoran después de 4 semanas de tratamiento, a pesar de tomar regularmente la dosis recomendada, debe consultar a su médico.

#### **Uso de otros medicamentos:**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

### **Embarazo y lactancia**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

#### **Importante para la mujer:**

Si está usted embarazada o cree que pueda estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o para el feto, y debe ser vigilado por su médico.

### **Conducción y uso en máquinas:**

No se han descrito.

## **3. Cómo tomar THROMBESCINA**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Recuerde tomar su medicamento.

#### Adultos y niños mayores de 12 años:

- Tomar 1 comprimido recubierto dos veces al día.
- Para obtener un efecto óptimo se recomienda de 4 a 8 semanas de tratamiento.
- Es aconsejable que las tomas se realicen siempre a las mismas horas.
- Los comprimidos deben ser ingeridos enteros, sin masticar.
- Se recomienda beber un vaso de agua con cada toma.
- Si estima que la acción de Thrombescina es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

#### **Si toma más Thrombescina del que debiera:**

En casos de sobredosis o ingestión accidental de cantidades grandes de Thrombescina, acuda inmediatamente a un centro médico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

#### **Si olvidó tomar Thrombescina:**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

## **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, Thrombescina puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

En raras ocasiones pueden presentarse náuseas, picor y alteraciones gastrointestinales.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informa a su médico o farmacéutico.

## **5. Conservación de THROMBESCINA**

Mantener Thrombescina fuera del alcance y de la vista de los niños.

### Condiciones de conservación

- Conservar protegido de la humedad.
- No conservar a temperatura superior a 25°C.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

### Caducidad de Thrombescina:

No use este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## 6. Información adicional

### Composición de Thrombescina:

El principio activo es extracto de *Aesculus hippocastanum* 263,2 mg de extracto seco, obtenido con etanol al 58% v/v, de semillas de *Aesculus hippocastanum* (Castaño de Indias) (relación planta seca / extracto: 4,5-5,5 : 1), estandarizado a 50 mg de glicósidos triterpénicos, calculados como Escina desprovista de agua.

Los demás componentes son: Calcio hidrogenofosfato, dióxido de silicio altamente dispersado, derivados del ácido poliacrílico, trietilcitrate, polisorbato 80, povidona, crospovidona, estearato de magnesio, hipromelosa, macrogol 4000, emulsión de dimeticona, talco, sacarina sódica, vainillina y colorantes dióxido de titanio (E-171) y óxido de hierro (III) / óxido de hierro hidrato (E-172).

### Aspecto del producto y contenido del envase:

Thrombescina se presenta en forma de comprimidos de liberación prolongada y recubiertos con película. Cada envase contiene 50 comprimidos.

### Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación:

LACER, S.A.; Sardenya, 350; 08025 Barcelona (España)

### Este prospecto se ha aprobado en:

Abril 2013



LACER, S.A. SARDENYA, 350  
08025 BARCELONA ESPAÑA